

Nazwa produktu: **Agravita® Cu**

Nawóz dolistny o formulacji płynnej

NAWÓZ WE

 Typ nawozu: **E.1.3.3f**
Roztwór nawozu miedziowego

 Producent: **CALDENA sp. z o.o. sp. k.**


SKŁAD:

Składniki pokarmowe	Zawartość [% m/m]	Zawartość [% m/v]	Zawartość [g/l]
Azot całkowity (N)	3,1	3,9	39
Azot azotanowy (N-NO ₃)	3,1	3,9	39
Miedź (Cu) rozpuszczalna w wodzie	9,0	11,3	113

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE:

Postać: płyn

Barwa: niebieska

Gęstość: 1260 g/l

pH: 1-2

SPÓSÓB STOSOWANIA:

Opryskiwać rośliny za pomocą sprzętu i końcówek umożliwiających otrzymanie drobnych kropel, które zapewnią równomierne pokrycie roślin (oprysk drobnokroplisty). **UWAGA!** Zabieg opryskowy należy wykonywać zgodnie z zasadami dobrej praktyki rolniczej. Zwrócić szczególną uwagę na warunki pogodowe w trakcie zabiegu. Nie wykonywać oprysku w dni suche, słoneczne, upalne oraz na powiędnione (odwodnione) rośliny. Nie przekraczać zalecanych dawek. **PRZED UŻYCIEM WSTRZĄSNAĆ!**

MOŻLIWOŚĆ ŁĄCZNEGO STOSOWANIA Z INNYMI PREPARATAMI:


Nawóz można stosować łącznie z większością fungicydów i insektycydów oraz innymi nawozami z zachowaniem ogólnych zasad mieszania preparatów chemicznych. Jeżeli zachodzi obawa co do zgodności, należy przeprowadzić próbę w oddzielnym naczyniu.

W razie wątpliwości prosimy kontaktować się z przedstawicielem terenowym dystrybutora.

ZALECENIA STOSOWANIA:

Roślina uprawna	Dawka [l/ha]	Ilość wody [l/ha]	Liczba zabiegów	Termin stosowania
Zboża	0,5-1	200-300	2	Jesienią od fazy 3 liści. Wiosną od momentu ruszenia vegetacji do fazy 2. kolanka.
Rzepak	0,5-1	200-300	1-2	Jesienią od fazy 4-6 liści. Wiosną od momentu ruszenia vegetacji do końca fazy zielonego pąka.
Kukurydza	0,5-1	200-300	1	W fazie 4-8 liści.
Ziemniaki	0,5-1	200-300	1-2	Od pełnych wschodów do końca fazy kwitnienia.
Buraki	0,5-1	200-300	1-2	Od fazy 4 liści do zakrycia międzyrzędzi.
Rośliny bobowate	0,5-1	200-300	1-2	Od pełnych wschodów do początku fazy kwitnienia.
Warzywa	0,5-1	400-600	1-2	W okresie intensywnego wzrostu, w odstępach 10-14-dniowych.
Drzewa i krzewy owocowe	0,5-1	500-1000	2-3	Profilaktycznie lub interwencyjnie w całym okresie vegetacji.
Użytki zielone	0,5-1	200-300	2-3	Od momentu ruszenia wiosennej vegetacji do połowy września – 7-10 dni po każdym pokosie/wypasie.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:



NIEBEZPIECZEŃSTWO

H290 – Może powodować korozję metali. H314 – Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. H410 – Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. P280 – Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. P301 + P330 + P331 – W PRZYPADKU POŁKNIECIA: wypluć usta. NIE wywoływać wymiotów. P303 + P361 + P353 – W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody (lub prysznicem). P304 + P340 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania. P305 + P351 + P338 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P501 – Zawartość/pojemnik usuwać do organizacji samorządu gospodarczego wskazanej przez dostawcę.

UFI: 9TS2-N0QM-400Q-KJTU

UN-nr: 3264

MATERIAŁ ŻRĄCY CIEKŁY, KWAŚNY, NIEORGANICZNY, I.N.O.

Zawiera diazotan miedzi (II); siarczan miedzi (II), pentahydrat; kwas azotowy (V)

Klasa zagrożenia w transporcie: 8; Grupa pakowania: 2

PRZECHOWYWANIE:

Nawóz należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w miejscu suchym i nienastłonecznionym w temperaturze 5-30°C.



10 l

DOSTĘPNE OPAKOWANIA / POJEMNOŚCI:



10 l

Informacje przedstawione w niniejszej karcie danych bezpieczeństwa są wedle naszej najlepszej wiedzy, przekonania i informacji poprawne na moment ich opublikowania. Informacje służą jedynie jako wytyczne bezpiecznego obchodzenia się z materiałem, jego wykorzystywania, przetwarzania, przechowywania, transportowania, pozbywania się oraz udostępniania go i nie mogą być uznawane za rękojmię ani określenie jakości. Informacje te odnoszą się wyłącznie do określonego opisanego materiału i mogą być niewłaściwe dla takiego materiału wykorzystywanego w połączeniu z jakimkolwiek innym materiałem ani w jakimkolwiek procesie, chyba że zaznaczono inaczej w tekście.

CALDENa sp. z o.o. sp. k.

ul. Parkowa 2, 82-230 Trępnów, Poland

T: +48 55 615 16 11

Infolinia 800 100 000

www.caldena.com

Karta techniczna produktu
Agravita® Cu