

Nazwa produktu: **Agravita® Macro**

Nawóz dolistny o formulacji płynnej

NAWÓZ WE

Typ nawozu: **C.2.1.**

Roztwory nawozowe NPK

Producent: **CALDENA sp. z o.o. sp. k.**



SKŁAD:

Składniki pokarmowe	Zawartość [% m/m]	Zawartość [% m/v]	Zawartość [g/l]
Azot całkowity (N)	8,0	9,2	92
Azot amidowy (N-NH ₂)	8,0	9,2	92
Pięciotlenek fosforu (P ₂ O ₅) rozpuszczalny w wodzie	3,0	3,4	34
Tlenek potasu (K ₂ O) rozpuszczalny w wodzie	4,1	4,7	47

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE:

Postać: płyn

Barwa: brązowa

Gęstość: 1150 g/l

pH: 4-5

SPOSÓB STOSOWANIA:

Opryskiwać rośliny za pomocą sprzętu i końcówek umożliwiających otrzymanie drobnych kropel, które zapewnią równomierne pokrycie roślin (oprysk drobnokroplisty). **UWAGA!** Zabieg opryskowy należy wykonywać zgodnie z zasadami dobrej praktyki rolniczej. Zwrócić szczególną uwagę na warunki pogodowe w trakcie zabiegu. Nie wykonywać oprysku w dni suche, słoneczne, upalne oraz na powiędniete (odwodnione) rośliny. Nie przekraczać zalecanych dawek. **PRZED UŻYCIEM WSTRZĄSNAĆ!**

MOŻLIWOŚĆ ŁĄCZNEGO STOSOWANIA Z INNYMI PREPARATAMI:

Nawóz można stosować łącznie z większością fungicydów i insektycydów oraz innymi nawozami z zachowaniem ogólnych zasad mieszania preparatów chemicznych. Jeżeli zachodzi obawa co do zgodności, należy przeprowadzić próbę w oddzielnym naczyniu.

W razie wątpliwości prosimy kontaktować się z przedstawicielem terenowym dystrybutora.

ZALECENIA STOSOWANIA:

Roślina uprawna	Dawka [l/ha]	Ilość wody [l/ha]	Liczba zabiegów	Termin stosowania
Zboża	3-7	200-300	3-4	Jesienią od fazy 3 liści. Wiosną od momentu ruszenia vegetacji do fazy dojrzałości młecznej ziarna.
Rzepak	3-7	200-300	3-4	Jesienią od fazy 3 liści. Wiosną od momentu ruszenia vegetacji do końca fazy zielonego pąka. W fazie opadania płatków.
Kukurydza	3-7	200-300	2-3	Od fazy 3 liści do możliwości technicznej wykonania zabiegu.
Ziemniaki	3-7	200-300	2-4	Od pełnych wschodów do fazy intensywnego wzrostu bulw.
Buraki	3-7	200-300	2-3	Od fazy 4 liści do fazy przyrostu masy korzenia.
Rośliny bobowate	3-7	200-300	1-2	Od pełnych wschodów do początku fazy kwitnienia.
Warzywa	3-7	400-600	2-4	W całym okresie vegetacji i nie później niż 14 dni przed zbiorem warzyw.
Drzewa i krzewy owocowe	3-7	500-1000	2-4	Przed kwitnieniem. Po kwitnieniu. W fazie intensywnego wzrostu owoców. Po zbiorach owoców.
Użytki zielone	3-7	200-300	2-3	Od momentu ruszenia wiosennej vegetacji do połowy września – 7-10 dni po każdym pokosie/wypasie.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:



UWAGA

H319 – Działa drażniąco na oczy. H410 – Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. P273 – Unikać uwolnienia do środowiska. P305 + P351 + P338 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P337 + P313 – W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. P391 – Zebrać wyciek. P501 – Zawartość/pojemnik usuwać do wyznaczonego odbiorcy odpadów.

UFI: 4XR2-K0TN-200S-Y506

PRZECHOWYWANIE:


Nawóz należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w miejscu suchym i nienastępnym w temperaturze 5-30°C.



DOSTĘPNE OPAKOWANIA / POJEMNOŚCI:



20 l



1000 l

Informacje przedstawione w niniejszej karcie danych bezpieczeństwa są wedle naszej najlepszej wiedzy, przekonania i informacji poprawne na moment ich opublikowania. Informacje służą jedynie jako wytyczne bezpiecznego obchodzenia się z materiałem, jego wykorzystywania, przetwarzania, przechowywania, transportowania, pozbywania się oraz udostępniania go i nie mogą być uznawane za rękojmię ani określenie jakości. Informacje te odnoszą się wyłącznie do określonego opisanego materiału i mogą być niewłaściwe dla takiego materiału wykorzystywanego w połączeniu z jakimkolwiek innym materiałem ani w jakimkolwiek procesie, chyba że zaznaczono inaczej w tekście.

CALDENa sp. z o.o. sp. k.

ul. Parkowa 2, 82-230 Trępnów, Poland

T: +48 55 615 16 11

Infolinia 800 100 000

www.caldena.com

Karta techniczna produktu

Agravita® Macro